

## 插入透析導管的部位出血怎麼辦？

- 如果發現插入透析導管的皮膚部位出血或透析導管脫落，請用紗布或乾淨的毛巾用力壓住這個部位，並直接到醫院看急診。
- 如果注意到透析導管有血液從管子中流出，那可能是夾子沒關好。請立即關好夾子。
- 如果您發現管子末端的塞子脫落了，請跟透析室或醫院聯絡。
- 如果透析導管被意外切斷，請立即叫救護車（000）以獲得醫療救援。

## 由誰來使用透析導管？

- 透析導管只能由負責透析的護士使用，用於將您的身體跟血液透析機連接起來。醫生或其他護士不能用透析導管向您體內輸液或輸入藥物。

Vascular Access Nurse

0457 756 436

9113 1111 page 310

(週一至週五上午8點至下午4點半)

下班後請到急診部就診

跟進預約請聯絡：

Vascular Access Nurse at  
4West Dialysis Unit

0457 756 436

02 9113 1111 page 310




Reviewed By  
St George Hospital  
Consumer Advisory Group  
*Working together*

在4West Patients的協助下於2022年編寫  
Produced by South Eastern Sydney Local Health District



## 血液透析導管 資料手冊



Haemodialysis Catheter  
Information Brochure  
Chinese Traditional

## 為什麼需要透析導管？

在發生腎臟衰竭的時候，就必須做血液透析。為了做血液透析，就需要有“血管通道”。這樣，負責做透析的護士就能夠讓血液透析機跟血管連通，以便淨化血液。

血液透析導管（vascath）是柔軟的塑膠管，用以插入頸部、胸部或腹股溝等部位皮下的大靜脈。

導管在體外的部分用縫線固定。導管在體內的部分可能有一個小袖套（cuff）——也可能沒有，袖套有助於減少感染的風險，並在拆線之後讓導管保持固定。



## 插入透析導管

- 透析導管放置在：
  - a. 頸部的頸靜脈（也可能位於胸內）
  - b. 腹股溝的股靜脈
- 醫生將會決定放在哪個部位合適，並且向您解釋手術過程，還會請您簽署同意書。
- 如果您正在服用血液稀釋劑，醫生可能會建議您暫時停服這種藥，在先插入透析導管之後再服這種藥。
- 透析導管將在X光部、手術室或重症監護室的治療室中插入。
- 在插入透析導管之前，先用消毒劑清潔插入部位的皮膚，然後使用局部麻醉劑麻醉插入部位。
- 根據透析導管的類型，在手術前可能會注射鎮靜劑。

## 透析導管護理

- 在透析導管離開身體的部位會使用透明敷料。這種敷料由負責透析的護士每週——或根據需要——更換。
- 如果敷料鬆動或脫落，請用乾淨的紗布覆蓋這個部位並跟透析室聯絡，敷上新的敷料。
- 為了減少感染的風險，**請始終保持敷料乾燥**。在3天內不要全身淋浴，並且不要讓水直接流到透析導管插入部位。護士將為您提供塑膠淋浴罩，並演示其使用方法。
- 不要在透析導管附近使用剪刀等鋒利物品，以免損壞透析導管。
- 透析導管末端有黃色或紅色的塞子或蓋子。**請每天檢查這兩個塞子或蓋子是否仍然在來的地方**。如果不在，請立即跟透析室聯絡。